



PRODUCTEURS ! PRODUCTRICES!
LUTTEZ EFFICACEMENT CONTRE LE *STRIGA HERMONTHICA*
EN CONNAISSANT MIEUX SON CYCLE DE DEVELOPEMNT




-Zones écologiques d'attaque:
régions Kara et Savanes
 - Culture infestées : **maïs, sorgho et mil de 6 mois, riz pluvial**



Cycle biologique :
Deux phases de développement
 - une phase **souterraine**
 (germination, fixation sur les racines de la plante attaquée)
 - Une phase **aérienne**

I .CYCLE DE DEVELOPEMENT



II.METHODE DE LUTTE

POUR MIEUX LUTTER CONTRE CE STRIGA, PARTIQUEZ LA LUTTE INTEGREE !

Rotations de cultures : sorghos/légumineuses (Soja, arachide), sorgho/coton, maïs/mucuna ;
Utilisation des variétés tolérantes de Maïs : **ACR** et **TZEE** et des **Variétés précoces de Sorgho** : **SORVATO1** et **SORVATO 28** et de **Mil** : **mil de 3 mois**
Associations des cultures : cultures-faux hôtes (maïs-soja ; maïs-arachide ; maïs-voandzou)
 Pratique de monoculture de plantes Faux hôtes : soja, coton, arachide ;
Fertilisation avec urée + Fumure organique.